

## **ПОШИРЕННЯ ВІЛ – ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД СПОЖИВАЧІВ ІН'ЄКЦІЙНИХ НАРКОТИКІВ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

*Тимошук Т.В., лікар - інтерн*

*Науковий керівник - к. м. н., доцент Ільїна Н. І.*

*СумДУ, кафедра інфекційних хвороб*

Україна займає перше місце серед країн Східної Європи по поширенню ВІЛ-інфекції. Сумська область за рівнем захворюваності на ВІЛ/СНІД посіла сьоме місце серед 27 адміністративних територій України. Поширення хвороби набуло епідемічного характеру, що пов'язано з проникненням ВІЛ у середовище споживачів ін'єкційних наркотиків. Парентеральний шлях інфікування ВІЛ, зумовлений спільним використанням шприців, голочок, обладнання для приготування наркотиків, був і залишається домінуючим у наш час.

Метою дослідження було вивчити темпи поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків.

Дослідження проводились на базі Сумського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. Нами було оброблено дані за період з 1997 року по 01.01.2008 року. За цей час в області було зареєстровано 909 ВІЛ-інфікованих осіб, що складає 75,17 на 100 тис. населення, та 80 хворих на СНІД. Слід відмітити, що 179 з них було виявлено у 2007 році. На диспансерному обліку в Сумському обласному центрі профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу станом на 01.01.2008 знаходиться 592 особи, серед них 215 (36,3 %) є споживачами ін'єкційних наркотиків, з них 33 хворих на СНІД (15,3 %). Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих, хворих на наркоманію, у 2007 році виявлено в місті Суми (9 чоловік). Друге місце посідають Шосткинський, Роменський, Конотопський райони (по 7 осіб відповідно). Для порівняння, в 2006 році було 56 ВІЛ-інфікованих ін'єкційних наркоманів, що на 26 % менше проти 2007 року. На першому місці стояв Шосткинський район (8 осіб), на другому місці – Конотопський (6), на третьому – Кролевецький (5). Частка чоловіків у 2006 році становила 62,5 % (35 осіб), жінок – 37,5 % (21); у 2007 році чоловіки склали 60,4 % (130), жінки 39,6% (85).

Слід зазначити, що в нашому регіоні нові випадки інфікування ВІЛ в значній мірі сконцентровані у віковій групі 15 – 24 роки.

Таким чином, протягом 2007 року збільшилась кількість ВІЛ-інфікованих серед ін'єкційних наркоманів у порівнянні з 2006 роком, що, можливо, пов'язано з більшою доступністю методів обстеження і їх анонімністю.