

**ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А В УМОВАХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Шабло І.А., лікар-інтерн

Науковий керівник – к. м. н., доцент Ільїна Н.І.

СумДУ, кафедра інфекційних хвороб

Вірусний гепатит А (ВГА) – одне з найбільш розповсюджених на планеті захворювань. Оцінюючи поширеність ВГА, слід враховувати, що на один випадок жовтяничної форми припадає 5 випадків без жовтяниці. Більш високі, ніж у розвинутих країнах світу, показники захворюваності на ВГА, особливо серед молодого працездатного населення, низький рівень комунального благополуччя населених пунктів, імунологічна незахищеність молодого населення, а також значні економічні збитки, що пов'язані з даним захворюванням, ставлять проблему профілактики та своєчасної діагностики ВГА в розряд актуальних.

Мета - вивчити клініко-епідеміологічні особливості перебігу ВГА в Кролевецькому районі за період з 2004 по 2006 рр.

Проведено ретроспективний аналіз 123 медичних карт стаціонарних хворих на ВГА, що перебували на лікуванні в інфекційному відділенні Кролевецької ЦРЛ у 2004-2006 рр. Діагноз було встановлено на підставі клініко-епідеміологічних та лабораторних даних.

Вік обстежених коливався від 1 до 49 років: хворі у віці 1-15 років склали 30 %; 16-30 - 56 %; 31-49 – 22,8 %. Частіше хворіли на ВГА чоловіки (62,6 %), ніж жінки (37,3 %). Спостерігалася осінньо-зимова сезонність. У 11,4 % хворих переджовтяничний період перебігав за грипоподібним типом, у 42,3 % - за диспепсичним та у 46,3 % - за змішаним. Практично в усіх хворих (99,2 %) спостерігався середньотяжкий перебіг захворювання і лише в 0,8 % – легкий. Жовтянична форма спостерігалася у 90,2 %, безжовтянична – у 9,8 %. Середня тривалість перебування в стаціонарі склала 27 ліжко-днів.

Таким чином, захворюваність на ВГА у Кролевецькому районі характеризується ураженням молодих осіб, хворіють переважно чоловіки у віці до 30 років. Переважає жовтянична форма середнього ступеня тяжкості. Характерна осінньо-зимова сезонність.