

**МЕТАБОЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В ЛІКУВАННІ  
ДІАБЕТИЧНОЇ ОСТЕОАРТРОПАТІЇ**

*Данилова О.В., студ.6-го курсу;*

*Мелеховець Ю.В., лікар-хірург СМКЛ №4, Подорога О.І., асистент*

*Науковий керівник – доц. Мелеховець О.К.*

*СумДУ, медичний інститут,  
кафедра сімейної медицини з курсом ендокринології*

За даними літератури вже на момент маніфестації цукрового діабету у 6% хворих вже виявляються прояви полінейропатії, а при тривалості діабету більше 10 років – у 60% хворих. Одним з патогенетичних типів нейропатії при тривалому перебігу цукрового діабету є остеоартропатія. Для діабетичної остеоартропатії притаманний прогресуючий розвиток з формуванням незворотної структурно-функціональної неповноцінності суглобів стопи.

**Метою** проведеного дослідження була оцінка ефективності ранньої метаболічної корекції у хворих з діабетичною остеоартропатією.

В дослідження було включено 2 групи пацієнтів з діабетичною остеоартропатією на тлі компенсованого або субкомпенсованого перебігу цукрового діабету. Перша група (7 осіб) отримувала стандартне патогенетичне лікування цукрового діабету, друга група (8 осіб) окрім цього довготривало отримувала препарати  $\alpha$ -ліпоєвої кислоти у добових дозах 600 мг протягом 6-8 місяців безперервно.

При проведенні комплексного обстеження хворих обох груп доведено, що в динаміці у пацієнтів другої групи темпи прогресування деструктивних змін в тканинах стопи були повільнішими, ніж у пацієнтів першої групи, а запальні процеси протягом нагляду розвивались на 70% рідше.