

## СОЦІАЛЬНО-СТАТУСНІ ТА СПАДКОВІ ФАКТОРИ РИЗИКУ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА ПЕРШІЙ ПСИХОТИЧНИЙ ЕПІЗОД

*Мудренко І.Г., асистент*

*СумДУ, кафедра нейрохірургії та неврології*

Вивчено розподіл 100 хворих з першим психотичним епізодом (ППЕ) за віком, статтю, рівнем освіти, сімейним положенням, соціальним статусом та спадкові чинники, які впливають на частоту аутоагресивної поведінки (АП). З них 58 мали аутоагресивні прояви (суїцидальні думки, рішення, наміри, спроби), 42 хворих без (АП) увійшли до контрольної групи.

У гендерному аспекті хворі розподілились наступним чином: у основній групі переважали жінки (55,20 %), а у контрольній у 59,50 % випадків – чоловіки. Більшість хворих були молодого віку: від 17 до 29 років кількість хворих становила 71,40 %, 25,90 % - віком понад 29 років. У групі пацієнтів з АП 65,50 % хворих ніколи не перебували у шлюбі, розлучених становила 19,00 %, тільки 12,10 % пацієнтів мали свою сім'ю. Рівень освіти у хворих основної групи був вищим: 31,00 % пацієнтів мали вищу освіту, у контрольній групі переважали особи з середньою освітою (59,50 %). Соціальний статус пацієнтів основної групи характеризувався наявністю роботи (37,90 %), навчання (15,50 %), хворі контрольної групи здебільшого не мали роботи (54,80 %). Таким чином, аналіз соціальних характеристик хворих з ППЕ продемонстрував наявність специфічних предикторів суїцидальної поведінки, до яких належать: жіноча стать; вік 20-29 років ( $p \leq 0,05$ ); вища або середня освіта ( $p \leq 0,05$ ); відсутність особистої сім'ї ( $p \leq 0,001$ ).

Вивчення анамнезу показало, що 51,58 % обстежених основної групи мали спадкову обтяженість психічними захворюваннями, 19,00 % - алкоголізмом, 36,00 % обстежених з аутоагресивною поведінкою мали особово змінених родичів, суїцидальна поведінка у родичів хворих спостерігалася в 5,17 % випадків, завершені самогубства скоїли близькі родичі 15,50 % пацієнтів. У контрольній групі спадкова обтяженість психічними захворюваннями спостерігалась у 71,40 % хворих, особово змінених родичів мали 28,60 % обстежених, в одному випадку спостерігався завершений суїцид у родича хворого (2,38 %), спроби самогубства вчинили рідні 2 хворих (4,76 %).

Установлена достовірна розбіжність між хворими основної і контрольної груп за рівнем спадкової обтяженості завершеними самогубствами ( $p \leq 0,05$ ). Таким чином, суїцидальна історія у родині є важливим предиктором АП під час ППЕ.