

**СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ У РОЖЕНИЦ
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ**
*Сумцов Д.Г., канд. .мед.наук, ассистент; Сумцов Г.О., доцент
СумГУ, медицинский институт,*

кафедра семейной медицины с курсом эндокринологии

Проведен ретроспективный анализ течения раннего неонатального периода у новорожденных от 72 женщин с хроническим пиелонефритом. В зависимости от клинического течения заболевания почек все женщины и, соответственно, рожденные ими дети были разделены на 2 группы. В I группу вошли 33 пациентки, в анамнезе у которых до настоящей беременности был хронический латентный пиелонефрит. В течение настоящей беременности обострений заболевания не наблюдалось. II группу составили 39 пациенток с обострением хронического пиелонефрита во время беременности. Обострение пиелонефрита впервые наблюдалось в 35% случаев во II триместре беременности. У 23 (58,9%) женщин оно было однократно, у 15 (38,5%) – двукратно, трижды – в 1 случае (2,6%).

Анализ исхода беременности у обследованных пациенток показал, что самопроизвольные роды в сроке беременности 38-40 недель произошли у 30 (90,1%) женщин I группы и у 31 (79,5%) II группы. Одна женщина (3,0%) в I группе и 2 (5,1%) во II группе родоразрешены путем абдоминального кесарева сечения. У 2 (6,1%) пациенток I группы и 3 (7,7%) II группы имели место преждевременные роды живыми детьми. У 3 (7,7%) женщин II группы произошел самопроизвольный аборт позднего срока. Общая частота неблагоприятных исходов беременности у женщин I группы была почти в полтора раза ниже, чем у пациенток II группы (6,1% и 15,4%).

Изучение состояния новорожденных, рожденных от матерей с хроническим пиелонефритом показало, что средняя масса и длина тела новорожденных у обследованных женщин обеих групп почти не отличались. Новорожденные от матерей II группы оценены по шкале Апгар в 8-10 баллов лишь в 51,3% случаев. Каждый пятый ребенок этой группы родился в асфиксии II степени тяжести.

Ранний неонатальный период у детей, рожденных от матерей II группы, протекал более неблагоприятно, чем у новорожденных от матерей I группы. Патологическая потеря веса в 1,1 раза чаще встречалась у новорожденных от матерей II группы. Время пребывания детей в отделении новорожденных зависело от их состояния при рождении и течения неонатального периода и составляло в среднем в I группе $5,9 \pm 1,3$ дня, во II группе – $6,7 \pm 1,4$ дня.

Таким образом, результаты проведенного анализа состояния новорожденных у женщин с хроническим пиелонефритом показали, что при обострении хронического пиелонефрита частота осложнений в раннем неонатальном периоде выше, чем при латентном течении.