

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ШИЗОФРЕНИИ

*Мудренко И.Г., аспирант
Научный руководитель – проф. Бачериков А.Н.
СумГУ, медцинский институт, кафедра нейрохирургии, неврологии
с курсом психиатрии*

Уровень самоубийств в Украине составил 29 на 100 000 населения.

Целью нашего исследования явилось изучение уровня суицидального риска у пациентов с различными формами шизофрении.

Нами обследовано 100 пациентов с первым эпизодом шизофрении с помощью методики «Способ определения суицидального риска».

Оценки показателя суицидального риска в группах пациентов с разными формами шизофрении были практически однородными и составили $24,40 \pm 2,31$ балла, что отражает высокий уровень суицидального риска, а также свидетельствует об общности восприятия пациентами своего состояния. У большинства обследованных с параноидной формой шизофрении (52,38 %) отмечался высокий уровень суицидального риска (30,81 балла), в ответах преобладали такие высказывания, что «они обречены», «перед ними стоят такие трудности, которых нельзя преодолеть», они часто чувствовали, что «в жизни не будет счастья», будущее «казалось безнадежным». У 47,61 % пациентов этой группы показатель суицидального риска составлял 17,40 баллов, что свидетельствовало об отсутствии у них суицидального риска. При этом в их ответах чаще звучали такие высказывания: "я не считаю себя обреченным человеком", "мои ошибки могут быть прощены", "жизнь не кажется безнадежной" и т.д.

У пациентов с простой формой шизофрении чаще отмечалось отсутствие суицидального риска (в 52,94 % случаев). Больные этой группы отмечали желание жить, были достаточно оптимистично настроены и считали, что "все можно исправить". У 47,05 % обследованных был выявлен высокий уровень суицидального риска (31,62 балла), что отражалось в их ответах: они были «полностью безразличны к своему будущему», считали, что не «способны ни на что».

У большинства пациентов (60%) с острым полиморфным психотическим расстройством отмечался высокий уровень суицидального риска (28,16 баллов). Пациенты были настроены пессимистично, не видели просвета в будущем, считали, что "никому нет до них дела" и выражали мысли, что «они обречены». У 40 % обследованных данной группы показатель суицидального риска составил 18 баллов, что свидетельствовало об отсутствии у них суицидального риска.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о некоторой равномерности распределения уровня суицидального риска у больных с первым эпизодом шизофрении в зависимости от формы расстройства.