

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ

Хоменко А.И.; Хоменко В.А., студ. 5-го курса

Научный руководитель - д. м.н., проф. Смиян А.И.

СумГУ, кафедра педиатрии последипломного образования

Принятые внутрь суррогаты алкоголя вызывают сильное отравление, нередко со смертельным исходом. Они делятся на две основные группы. К одной относятся различные препараты, в которых есть алкоголь (этиловый спирт), например, многие медикаменты, политура, лаки и другие бытовые химикалии, косметические средства: одеколоны, элексиры, лосьоны. К другой - технические жидкости, не содержащие этилового спирта: этиленгликоль, ацетон, метиловый спирт, дихлорэтан.

На протяжении 2007 года в ОРИТ СДКБ поступило 20 детей с таким диагнозом. При этом тактика на догоспитальном этапе должна быть следующей.

Лечебные мероприятия включают:

промывание желудка - дают выпить пострадавшему 4-5 стаканов воды комнатной температуры, можно добавить в каждый стакан по половине чайной ложки питьевой соды;

затем осторожно надавить ручкой ложки или пальцем на корень языка, чтобы вызвать рвоту;

после этого дать внутрь солевое слабительное (сернокислую магнезию – 0,5 г/кг, растворив в стакане воды), энтеросорбенты (активированный уголь или полифепан – 0,5 г/кг).

Если ребенок без сознания, нельзя вливать в рот больному воду, пытаясь промыть желудок.

При подтвержденном отравлении метиловым спиртом, можно дать этанол в\в 5% раствор (или 30% раствор - внутрь) в общей дозе 1г\кг массы тела (96% этанола) в сутки в виде 5% раствора на 5% глюкозе, или перорально по 50 мл 30% этанола каждые 3 часа. Если пострадавший без сознания - уложить его без подушки на бок, с опущенной вниз головой, чтобы исключить попадания рвотных масс в дыхательные пути.

Отравления суррогатами алкоголя требует незамедлительной медицинской помощи.