

ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ

Васильєва О.Г., аспірант

Науковий керівник - д. м. н., проф. Сміян О.І.

СумДУ, кафедра педіатрії післядипломної освіти

Гостра пневмонія є одним з найпоширеніших захворювань у дитячому віці. Захворюваність на пневмонію становить від 4 до 17 випадків на 1000 дітей. За даними В.Г. Майданника (2003) частина гострої пневмонії в структурі причин госпіталізації немовлят становить 6,5%, а у госпіталізованих дітей віком до 1 року пневмонія виявляється в 25-35% випадків.

З метою вивчення особливостей перебігу пневмонії у дітей раннього віку на сучасному етапі нами піддані ретельному клініко-статистичному аналізу історії хвороби 38 дітей.

Пневмонія у всіх вікових групах дітей зустрічалась однаково часто, як у хлопчиків так і у дівчат. Більшість хворих ($68,2 \pm 3,8$ %) народилися від 1-ї вагітності. У $36,84 \pm 3,7$ % матерів вагітність перебігала на фоні дефіцитної анемії різного ступеня важкості, у $21,05 \pm 3,5$ % - перебіг вагітності ускладнився загрозою переривання, у $10,5 \pm 2,7$ % - токсикозом 1 половини, у $13,16 \pm 2,7$ % - токсикозом 2-ї половини вагітності. У $47,37 \pm 4,7$ % матерів вагітність перебігала без ускладнень.

$5,26$ % дітей народилися недоношеними, $7,89$ % дітей - в асфіксії.

Серед дітей, які хворіли на пневмонію майже $1/3$ ($31,58$ %) народилися з масою тіла нижче 3000 г. Серед всіх вікових груп хворих на пневмонію дітей більше половини ($52,63$ %) знаходилися на штучному вигодовуванні. До того ж, майже $1/4$ ($23,68 \pm 3,6$ %) дітей раннього віку отримували штучні суміші з народження.

Встановлено, що діти раннього віку частіше хворіли зимою ($44,74$ %, $p < 0,05$). Діти першого року життя достовірно частіше хворіли зимою ($52,6$ %), ніж весною ($21,0$ %), літом ($13,1$ %), та восени ($13,3$ %).

Крім того, при вивченні аналізу життя дітей раннього віку було встановлено, що більшість із них вже хворіли на пневмонію вдруге ($52,6 \pm 4,2$ %, $47,4 \pm 4,2$ %, $p < 0,05$).

Таким чином, з наведених вище даних можна сформулювати групи ризику дітей раннього віку по розвитку пневмоній: діти від матерів з ускладненим перебігом вагітності; недоношені, або діти яку народилися у асфіксії; діти з масою тіла менше 3000 г.; діти які знаходяться на штучному вигодовуванні.