

ПОСТКОНТАКТНА ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

*Близнюк Я.В., Сокол О.В., студ. 5-го курсу
Науковий керівник – асист. Троцька І.О.
СумДУ, медичний інститут, кафедра інфекційних хвороб*

Щороку в Україні близько 5 тисяч медпрацівників набувають статусу потерпілих під час виконання професійних обов'язків.

Метою нашої роботи було проведення аналізу причин виникнення аварійних ситуацій та вивчення ефективності комплексу заходів щодо попередження ВІЛ-інфікування на робочому місці.

Був проведений аналіз 14 звітів закладів охорони здоров'я про небезпечні контакти із потенційно інфікованим матеріалом за період 2003 – 2005 рр. Виявлений такий розподіл потерпілих за ступенем ризику інфікування: високий (71 %), низький (29 %). Жінки серед постраждалих склали 79 %. У 65 % профаварії виникли при стажі роботи 5 – 10 рр. Постконтактна профілактика проведена у 79 % випадків. Після контрольного тестування результати обстеження були негативні.

Таким чином, проведені нами дослідження дозволили визначити шляхи зниження ризику професійного ВІЛ-інфікування розробити такі практичні рекомендації:

- з урахуванням частоти аварійних ситуацій на 2006 рік у лікувально-профілактичних закладах області можна спрогнозувати від 5 до 10 небезпечних контактів з ВІЛ-інфікованим матеріалом на робочому місці. Виходячи з цього, необхідно мати в наявності відповідну кількість антиретровірусних препаратів;
- необхідно удосконалити систему навчання персоналу правил профілактики ВІЛ-інфікування з акцентом на найбільш уразливі групи.