

МІКРОБІОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА ПРИ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ

*Маркевич О.В., Дранко М., студ. 5-го курсу
Науковий керівник – асист. Клименко Н.В.
СумДУ, медичний інститут, кафедра інфекційних хвороб*

Вірусні гепатити є однією з актуальних проблем сучасної інфекційної патології. Особливістю клінічного перебігу гепатитів є розвиток позапечінкових змін.

Метою даного дослідження було вивчення частоти розвитку дисбактеріозу кишечника при хронічних вірусних гепатитах В та С.

Діагноз дисбактеріозу встановлювали на основі анамнезу, клінічних та лабораторних даних. Проаналізовано 104 медичних картки хворих із хронічним вірусним гепатитом В, С та мікст гепатитом В і D, що перебували на лікуванні в СОІКЛ, з них 74 чоловік та 30 жінок. Вік хворих коливався з 16 до 65 років. Дисбактеріоз кишечника виявлено у 71 % (74 хв.), з них при хронічному гепатиті - у 37,5% (39 хв.), хронічному гепатиті С - у 27,8% (29 хворих) та мікстгепатиту В та D у 5,76% (6 хв.).

У всіх пацієнтів відмічаються збільшення об'єму калу, кислий запах, кашкоподібне випорожнення. При мікроскопії випорожнень виявлено підвищення вмісту м'язових волокон у 80% хворих, сполучної тканини - у 48 %, крохмалю - у 94%, неперетравленої клітковини - у 96%, слизу в 100%, жирних кислот - у 41%, йодофільної флори - у 100 % випадків.

За нашими дослідженнями маємо такі результати: з 39 чоловік хворих на хронічний вірусний гепатит В, у 8 чоловік дисбактеріоз виявлено IV ст., 13 чол. – II ст., 18 чол. – III ст. З 29 чоловік, хворих хронічним вірусним гепатитом С у 12 чоловік дисбактеріоз I ст., у 17 чол. – III ст. З 6 чоловік хворих мікст- гепатитом В та D у 4 осіб дисбактеріоз II ст. у 2 чол. – IV ст.

Можна зробити висновки, що при хронічних вірусних гепатитах В та С, мікстгепатитах В і D, розвивається порушення нормальної мікрофлори кишечника та підвищується ріст бактерій (атипових штамів, умовно патогенної флори, поява протей, гемолізуючого стафілокока, синегнійної палички).