

СУЧАСНІ АСПЕКТИ НЕВИНОШУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ

Ілляшенко В.О., магістрант

Науковий керівник – проф. Маркевич В.Е.

СумДУ, кафедра педіатрії з курсом медичної генетики

Недоношеність є однією з причин смертності серед новонароджених дітей. На долю недоношених припадає 60-70% неонатальної смертності та до 75% смертності малюків. У недоношених спостерігається підвищена вірогідність розвитку різних захворювань та неврологічних порушень у старшому віці. Ці фактори змушують віднести до епідеміології недоношеності як до проблеми винятково важливої.

Мета роботи: вивчити фактори ризику передчасних пологів і особливості клінічного перебігу неонатального періоду у недоношених дітей.

Під наглядом знаходилося 30 недоношених дітей, які лікувалися у відділенні виходжування недоношених дітей Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. На долю недоношених 1 ст. прийшлося 33,3% (10 дітей), 2 ст.-53,3% (16 дітей), глибоко недоношені склали 13,4% (4 дитини).

Встановлено, що 100% дітей мали гіпоксичне ураження центральної нервової системи. У 61% у клініці домінували симптоми підвищеної нервово-рефлекторної збудливості. При нейросонографії у 61% дітей виявлені перивентрикулярні крововиливи, кісти, незрілість мозку. Кон'югаційна жовтяниця спостерігалася у 52% новонароджених.

Оскільки всі недоношені мали патологічний перебіг неонатального періоду, дослідження факторів ризику невиношування було край важливим. Встановлено, що у 56,5% матерів перебіг вагітності був обтяжений екстрагенітальною патологією (анемією, пієлонефритом та ін.). Гострі інфекційні захворювання перенесли 17% вагітних. Загроза переривання вагітності на ранніх строках спостерігалася у 43% жінок. У 39%- в анамнезі відмічалися медичні аборти, що дає можливість віднести їх до факторів високого ризику невиношування.

Отже, усунення зазначених чинників ризику сприятиме зменшенню частоти передчасних пологів.