

## ТИПОЛОГІЯ АУТОАГРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ У ХВОРИХ З МАНІФЕСТНИМ ПСИХОЗОМ ШИЗОФРЕНІЇ

*Мудренко І. Г., аспірант*

*Науковий керівник – проф. Бачериков А. М.*

*СумДУ, медичний інститут, кафедра нейрохірургії та неврології  
з курсом психіатрії, наркології та медичної психології*

Метою проведеного дослідження було вивчення типології та структурних характеристик аутоагресій у хворих з маніфестним психозом шизофренії.

В умовах гострого психіатричного відділення Сумського обласного психоневрологічного диспансеру було обстежено 30 пацієнтів під час першої госпіталізації до психіатричного стаціонару.

Дослідження проводилось з урахуванням суїцидальних хвилювань. У даному аспекті виділені наступні типи аутоагресивної поведінки:

- 1) несуїцидальні форми (безпричинні та необґрунтовані незадоволення собою, самоосуд, роздратованість та ненависть до себе);
- 2) до- і післясуїцидальні форми (несуїцидальні прояви за часом пов'язані зі спробами самогубств);
- 3) парасуїцидальні форми (демонстративно-шантажні аутоагресивні дії);
- 4) власне суїцидальні прояви (сюди відносять пасивні та активні суїцидальні думки, рішення, наміри, істинні спроби самогубств).

Розподіл обстеженого контингенту в залежності від форм аутоагресивної поведінки представлений наступним чином: несуїцидальні форми поведінки виявлені у 16,6%, до- та післясуїцидальні форми поведінки – у 3,3%, парасуїцидальні прояви – у 6,6%, власне суїцидальні форми аутоагресивної поведінки – у 33,3 % пацієнтів.

За поточний період одна хвора скоїла завершений суїцид (лягла під потяг).

Основні мотиви аутоагресивної поведінки пов'язані з конфліктами у особистісно-сімейній сфері та станом психофізичного здоров'я.