

ЧАСТОТА БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ З АНОМАЛІЯМИ КОНСТИТУЦІЇ

Рибалко О.В., лікар – інтерн

Науковий керівник - доцент Січненко П.І.

*СумДУ, медичний інститут, кафедра педіатрії післядипломної освіти, пропедевтики
дитячих хвороб з курсом дитячих інфекцій*

Бронхолегенева патологія у дітей є досить актуальною проблемою дитячого віку. Високу питому вагу серед захворювань дихальної системи займають діти з аномаліями конституції.

Нами проведено аналіз 116 історій розвитку дитини, у яких були прояви різних варіантів аномалій конституції. Вік дітей варіював від 2 до 5 років.

Як показали наші дослідження – найбільш частою формою аномалії конституції виявився ексудативно – катаральний діатез (65%), у два рази рідше зустрічався лімфатико – гіпопластичний діатез (32%) і тільки у 3% дітей зустрічався нервово - артритичний діатез. Всі діти даної категорії були віднесені до групи ЧДХ.

Бронхолегенева патологія виявлена у 33% відсотків дітей, причому у переважній більшості (77%) констатувався рецидивуючий бронхіт, у 16% дітей виявлений симпотокомплекс астматичних проявів.

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що діти з аномаліями конституції складають групу високого ризику в плані розвитку бронхолегеневої патології. Це диктує необхідність проведення профілактичних заходів, направлених на оздоровлення виявленої групи ризику.