

ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕНТЕРОЦЕЛЕ

Сумцов Г.О., доц.

СумДУ, кафедра акушерства та гінекології

Діагностика та лікування ентероцеле не описані навіть у солідних посібниках по оперативній гінекології сучасних авторів як С.Н. Давидов, В.І. Кулаков, І.Н. Рембез. За останні 10 років у гінекологічному відділенні СОЦАГР 237 оперованих нами жінок з опущеннями та випадіннями статевих органів, у 10 випадках діагностовано ентероцеле. Вік хворих від 37 до 55 років, середній – 48,4. Половина з них раніше вже були оперовані з помилковим діагнозом “опущення статевих органів”, але звичайні пластичні операції не дали позитивного результату.

Ентероцеле – це кила, яка утворюється в результаті розходження ректо-вагінальної перегородки і діагностувати її можливо шляхом цілеспрямованого ректо-вагінального дослідження. Оперативне лікування потребує виділення кілового мішка, облітерації Дугласового простору, плікації крижево-маткових зв'язок.

Нами прооперовано 6 хворих лапаротомним та 4 – вагінальним доступом. В зв'язку з супутніми захворюваннями в 1 випадку проведено видалення матки, у 4 – пластика вагіни та левоторів. Результати операцій позитивні, післяопераційних ускладнень не було.