

ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ ПРОТОННОЇ ПОМПИ НА ФУНКЦІЮ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ

ВІННІЧЕНКО О.І., ГАЛІНСЬКА С.О., СТУД. 3-ГО КУРСУ

*Науковий керівник — асист. Вінніченко Л.Б.
Сумський державний університет, кафедра терапії*

На гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) страждають від 32% до 80% пацієнтів із бронхіальною астмою (БА).

Метою дослідження є вивчення впливу інгібіторів протонної помпи (ІПП) (омепразолу) на симптоми астми та функцію зовнішнього дихання.

Матеріали і методи дослідження: 30 хворих на БА в поєднанні із ГЕРХ були розділені на 2 групи: А та В. Пацієнти групи А (15 осіб) отримували сальбутамол по 200 мкг 4 рази на добу та будесонід по 400 мкг двічі на добу протягом 8 тижнів. Пацієнти групи В (15 осіб) отримували аналогічне лікування та антирефлюксну терапію – омепразол 40 мг на добу в 2 прийоми протягом 8 тижнів.

Результати дослідження: Не було суттєвої різниці в симптомах та основних показниках функції зовнішнього дихання на початку лікування в обох групах. Через 8 тижнів лікування показники функції зовнішнього дихання, такі як ОФВ1 та ПОШ, суттєво покращилися в групі В порівняно із групою А. ЖЄЛ та МВЛ статистично не відрізнялися в обох групах.

Висновки: Результати дослідження свідчать про те, що антирефлюксна терапія може покращити швидкісні показники функції зовнішнього дихання у астматичних хворих на ГЕРХ, не впливаючи при цьому на об'ємні.