

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ ПО БАТ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ВСД ПО ГІПЕРТОНІЧНОМУ ТИПУ

Маркевич О.В., Лазебник О.А., Лобода Т.О.

*СумДУ, медичний інститут, кафедра педіатрії післядипломної освіти
з курсом пропедевтики дитячих хвороб і дитячих інфекцій*

Серед неінфекційних захворювань серця у дітей судинні дистонії відносяться до найбільш поширеній патології. По даним різних авторів їх частота складає 10-25 %, серед них – переважають дистонії гіпертонічного типу.

Протягом 2005 року в педіатричному відділенні Сумської міської дитячої клінічної лікарні було проліковано 145 дітей. З вегето-судинною дисфункцією по гіпертонічному типу – 31. В комплексному лікуванні, наряду з традиційною терапією було застосовано лазеротерапію на біологічно активні точки.

Методика лазеропунктури включає в себе вплив на БАТ по 40-60" на 1 точку, сумарний час впливу складає до 5 хвилин. Всього проведено по 5 щоденних процедур.

Позитивна динаміка у вигляді зменшення метіочутливості, головних болей, кардіалгій була відмічена у 26 хворих. Тоді, як у дітей, що отримали лише традиційну терапію скарги на головний біль, метіочутливість, лабільність артеріального тиску залишилися майже до кінця курсу лікування.

Таким чином, застосування в комплексному лікуванні дітей з вегето-судинною дисфункцією по гіпертонічному типу лазеротерапії на БАТ дає змогу підвищити ефективність традиційної терапії, прискорює регрес головних болей, зменшує прояви метеозалежності.