

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БЕШИХИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

*Василенко В.О., Румянцева О.А., студ. 5-го курсу
Науковий керівник – доцент Ільїна Н.І.*

Сумський державний університет, кафедра інфекційних хвороб

Досліджені епідеміологічні особливості бешихи у 125 хворих, що перебували на лікуванні у Сумській обласній інфекційній клінічній лікарні протягом 2002 – 2004 рр.. Первинна бешиха діагностована у 68,7%, рецидивуюча – у 20,9%, повторна – у 10,4% хворих. Еритематозна форма була у 70,4%, еритематозно–бульозна – у 14%, бульозно–геморагічна – у 8,7%, еритематозно–геморагічна – у 6,9% пацієнтів. Чоловіки склали 41,7%, жінки – 58,3%. У віці до 20 років було 2,6% хворих, від 20 до 30 – 2,6%, від 30 до 40 – 7,8%, від 40 до 50 – 21,7%, від 50 до 60 – 24,3%, від 60 до 70 – 18,4%, старше 70 – 22,6%. Ураження нижніх кінцівок відмічено у 63,9% осіб, верхніх – у 9,6%, обличчя – в 20%, іншої локалізації – у 6,5%. Провокуючий фактор з'ясований у 79,2% хворих, з них у 44,8% бешиха виникла внаслідок травми (забой, інфіковані подряпини, потертості, тощо); 18,3% страждали на мікози стоп; 12,7% - на посттромбофлебічний синдром; 6,1% - на гнійничкові ураження шкіри; 4,3% - на трофічні виразки; 13,8% осіб перенесли ангіну. Із супутніх захворювань у 1,7% пацієнтів був лімфостаз, в 14,1% - цукровий діабет, у 27,1% - хронічна венозна недостатність. Рецидиви виникали частіше у осіб з наявністю фонових захворювань. Серед хворих мешканці міста склали 62,7%, села – 37,3%. Найбільша кількість хворих на бешиху зрєєстрована у липні, вересні, жовтні – 15,7%, 10,4%, 11,3% відповідно, найменша у червні – 1,7%.

Таким чином, на бешиху частіше хворіють жінки віком старше 50 років. Для неї характерна сезонність: кінець літа – рання осінь. Факторами ризику бешихи є ушкодження шкіри (мікротравми, мікози).