

ГЛІАТІЛІН ПРИ ВЕГЕТАТИВНИХ СТАНАХ

Авраменко М.Є., лікар

Науковий керівник – доц. Коленко Ф.Г.

Вегетативний стан (ВС) – це повна відсутність сприйняття себе і оточуючих, супроводжується хаотичними періодами сну і несну з частковим чи повним збереженням гіпоталамічних і стовбурових функцій. Термін ВС був запропонований Jennett and Plum у 1972 році. За останнє десятиріччя лікарі всього світу часто зустрічаються з проблемою курації хворих, які знаходяться в вегетативному стані. На першому місці серед причин вегетативного стану стоїть черепно-мозкова травма.

Хвора Б., 36 років, перенесла важку закриту черепно-мозкову травму на тлі якої розвився вегетативний стан. Лікувалася у стаціонарах і вдома. На КТ головного мозку у хворої констатовані розширення конвексітального субарахноїдального простору, в тому числі латеральних щілин мозку до 0,7 см, наявність утворення 1,58x2,7 см в проекції лівої вискової доли, з чіткими краями з наявністю ліквору, значного збільшення в об'ємі шлуночків мозку, атрофія головного мозку, вогнища перивентрикулярної енцефалопатії. Цистерни основи мозку розширені, асиметричні. На протязі 8 місяців хвора лікувалася гліатіліном по 400 мг 3 рази на добу до їжі. Також проведена судинна, загально-укріплююча терапія, ноотропи. Гліатілін (холіна альфосцерат) GLIATILIN являється новим сполученням, яке відноситься до групи центральних холіноміметиків з переважним впливом на ЦНС. Він покращує передачу нервових імпульсів в холінергічних нейронах, церебральний кровообіг, посилює метаболічні процеси в головному мозку, активує структури ретикулярної формації головного мозку і відновлює свідомість. Після 3 місяців прийому гліатіліну хвора почала фіксувати погляд, з'явилися певні рухи в лівих кінцівках, а після 8 місяців – цілеспрямовані рухи, певні звуки, прості слова та свідомість.