

## ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ У ХВОРИХ НА ПЕРФОРАТИВНУ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНУ ВИРАЗКУ

*Коробова С.П., інтерн-магістрант*

*Науковий керівник - канд.мед.наук, асистент Ситнік О.Л.*

*СумДУ, кафедра госпітальної та факультетської хірургії*

Із 538 оперованих з приводу перфоративної виразки у 94(17,5%) хворих діагностували післяопераційні ускладнення.

Абдомінальні ускладнення виявлені у 56 хворих, екстраабдомінальні – у 16, поєднані – у 22.

Абдомінальні ускладнення :

а) порушення моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту – у 26, із них у 9 спостерігались функціональні порушення (післяваготомна атонія шлунка – у 8, динамічна кишкова непрохідність – у 1), порушення органічної природи – у 17 (анастомозит – у 7, стеноз вихідного відділу шлунка – у 4, рання спайкова кишкова непрохідність – у 6);

б) ранові ускладнення – у 18;

в) шлунково-кишкові кровотечі – у 15;

г) перитоніт – у 8;

д) панкреонекроз після резекції шлунка за Гофмейстером-Фінстерером – у 1;

е) неспроможність швів із формуванням нориці - у 1.

Екстраабдомінальні ускладнення діагностували:

а) дихальної системи, переважно пневмония (19), - у 23 хворих;

б) серцево-судинної системи, в основному тромбоемболічні, - у 13 (переважно у хворих похилого та старечого віку або з супутньою патологією, а також при наявності перитоніту),

в) гостре порушення мозкового кровообігу – у 2.

Завдяки проведеній інтенсивній терапії у переважній більшості хворих ускладнення вдалося ліквідувати. Післяопераційна летальність знизилась з 37(6,9%) до 12(2,3%).