

ПЕРЕЛОМ КІСТОЧОК ГОМІЛКОВО-СТОПНОГО СУГЛОБУ

*Лихобаба М.П., студ. 6-го курсу
Науковий керівник – доц. Шищук В.Д.
Сумський державний університет,
кафедра ортопедії, травматології та НС*

Перелом кісточок складає близько 60% всіх переломів кісток гомілки. В більшості випадків механізм травми непрямий, який підрозділяється на пронаційний та супінаційний.

При супінаційному переломі пошкоджується латеральна зв'язка чи виникає перелом латеральної та медіальної кісточок.

При пронаційному переломі (перелом Дюпюїтрена) пошкоджується дельтоподібна зв'язка чи перелом медіальної ОЛДДЖДЖЗЦЗЗЦкісточки на 5-7 см вище гомілкового суглобу з пошкодженням між гомілкового синдесмозу. Коли малогомілкова кістка прикрита на 2/3 великогомілковою, можливі помилки в діагностиці, а також і в лікуванні.

Отже, хороший функціональний результат лікування переломів кісточок багато в чому залежить від правильного вибору методу лікування, який повинен ґрунтуватися не тільки на клініко-рентгенологічній картині, але й від анамнезу виникнення травми. Диференційний підхід до хворих з переломом кісточок являється основою успіху лікування цієї часто зустрічаючої патології.