

## **РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОКЛЮША НА УКРАИНЕ В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ XX СТОЛЕТИЯ**

*Васильева Е.Г., Васильев Ю.К., студ. 6-го курса*

*Руководитель – проф. Васильев К.К.*

*СумГУ, кафедра социально медицины и общей гигиены*

В распространении коклюша на Украине в XX столетии можно выделить два периода: до введения в практику здравоохранения средств специфической профилактики этой болезни (1959 – 1960 гг.) и после этого.

Согласно опубликованным официальным данным о заболеваемости детскими инфекциями на Украине и литературным материалам (Бирковский, К.Г. Васильев, С.М. Экэль и др.) заболеваемость коклюшем регистрировалась на всей территории Украины и колебалась в пределах от 30-40 до 300-430 на 100 000 населения. Причем, как отмечают авторы, в заболеваемости наблюдалась определенная периодичность (цикличность): чередование подъемов и спадов в распространении болезни. Крупные подъемы в заболеваемости коклюшем имеет место в 1902, 1912-1913, 1923-1924, 1929-1930, 1950, 1955 гг.

Заболеваемость коклюшем имела выраженную летнюю сезонность. Подъем заболеваемости начинался в июне-июле и достигал своего максимума в июле-августе. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детей в возрасте до 5 лет.

Перелом в распространении коклюша наступил в 60-х годах, когда начинается плановая иммунизация против этой болезни.