

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ПЕРФОРАТИВНИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК

*Ярошенко Ю.Г., Русановська І.Л., студ. 3-го курсу
Науковий керівник - асист. П'ятикоп Г.І.*

СумДУ, медичний інститут, кафедра загальної хірургії

Серед гострих хірургічних захворювань перфоративні гастродуоденальні виразки займають одне з перших місць.

Нами проведений аналіз 83 оперованих хворих за останні 3 роки. Вік хворих був від 21 до 72 років. З них чоловіків було 84%, жінок 16%. Слід зазначити, що виразковий анамнез складав від 1 до 20 років і встановлений у 74%. Більшість хворих (близько 75%) було у віці від 30 до 55 років. Близько 68% хворих раніше одержували консервативне лікування з приводу виразкової хвороби з тимчасовим поліпшенням. У 74% госпіталізованих спостерігався виражений больовий синдром.

Усім хворим обов'язково були виконані спеціальні інструментальні методи дослідження. Це оглядова рентгенографія органів черевної порожнини і ФГДС. Передопераційна підготовка проводилася відразу ж після надходження в стаціонар і полягала в інфузійно-дезінтоксикаційній терапії, введенні антибіотиків широкого спектру дії і симптоматичної терапії відповідно до супутньої патології.

Тривалість передопераційної підготовки була не більше 2-3 годин.

Обсяг оперативних втручань виконувався строго індивідуально: враховувався час надходження з моменту перфорації, тяжкість перитоніту, вік, розмір виразки, тривалість захворювання, наявність супровідних захворювань.

Перевага віддавалась висіченню виразки в межах здорових тканини з ваготомією і послідуною пілоропластикою. Обов'язковим було збереження ніжки Летарже. Первинна резекція шлунка у хворих з перфоративною виразкою проводилася за суворими показаннями.