

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

*Кравец В. П., канд. мед.наук, ст. препод., Кравец В. В., врач-хирург
СумГУ, медицинский институт, кафедра семейной медицины
с курсом эндокринологии*

Хирургическая раневая инфекция является основной причиной послеоперационных осложнений, летальности и значительных больничных затрат.

Необходимо отметить, что некоторые внутрибольничные инфекции практически невозможно предотвратить независимо ни от качества больничного ухода, ни от степени эффективности системы инфекционного контроля.

В больнице необходимо создать обстановку, которая обеспечивает правильное понимание всеми сотрудниками подхода к содействию мерам инфекционного контроля.

Основными требованиями профилактики хирургической раневой инфекции являются следующие:

1. Предоперационная подготовка больного – все выявленные бактериальные инфекции, кроме вызвавшей необходимость выполнения операции, должны быть излечены или взяты на контроль до операции. Продолжительность пребывания больного в стационаре перед операцией должна быть как можно меньше.
2. Строжайшее выполнение правил асептики и антисептики операционной бригадой.
3. Уход и подготовка операционной и оборудования. Обеспечение минимум 20-ти кратной смены воздуха в час, а также присутствие минимального количества медперсонала в операционной.
4. Бригада оперирующих хирургов должна владеть высокой техникой операции.
5. Бактериоскопия любого отделяемого из раны. Бережный уход за раной.
6. Применение антибактериальных препаратов до операции и в первые сутки после нее.
7. Защита пациента от других инфицированных лиц и персонала.

Неукоснительное выполнение требований профилактики дает снижение частоты возникновения хирургической раневой инфекции, уменьшение продолжительности лечения больных в стационаре и значительный экономический эффект.