

## **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СХЕМ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ**

*Бокова С.И., врач-интерн*

*Научный руководитель - доц. Мелеховец О.К.*

*СумГУ, медицинский институт, кафедра семейной медицины  
с курсом эндокринологии*

Проблема лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки занимает в практике врача семейной медицины особое место, а стремительное развитие фармацевтической промышленности обеспечивает возможности выбора и расширяет границы фармтерапии.

На базе отделения семейной медицины Шосткинской ЦРБ в 2004-2005г. было проведено исследование, целью которого являлось изучение эффективности различных групп антисекреторных препаратов. В зависимости от типа проводимой терапии пациенты были разделены на две группы. 1-я гр. (22 человека) получала стандартную квадритерапию в комплексе с эгланилом и психотерапевтическими беседами с семейным врачом. 2-я группа (18 чел) получала только квадритерапию. Длительность анамнеза заболевания от нескольких месяцев до 16 лет. Исходная клиническая симптоматика сочеталась с признаками вегетативной дисфункции различной степени выраженности, которая проявлялась в преобладании тонуса *p.vagus* Комплайенс оценивали при каждом посещении.

Сравнение эффективности терапии в обеих группах показало, что положительная клиническая динамика наступала раньше у больных, получавших седативные препараты в комплексе с психотерапевтическими беседами. Значимая роль в терапии принадлежит комплаенсу, который считался адекватным, если за время лечения пациент принимал назначенные ему препараты согласно предписаниям врача.