

ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТОДІВ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВРОСЛОГО НІГТЯ

*Євтушенко О. Р., лікар-інтерн
Науковий керівник - доц. Мелеховець О.К.
СумДУ, медичний інститут, кафедра сімейної медицини
з курсом ендокринології*

В результаті неправильного росту і форми нігтя утворюється болісне виразкування, що перешкоджає ходьбі та супроводжується обмеженням фізичної активності пацієнтів на деякий, а іноді тривалий час. Тому в практиці сімейного лікаря проблема врослого нігтя залишається актуальною в теперішній час.

Нами проаналізовані віддалені результати оперативного лікування врослого нігтя. Під спостереженням знаходилось 40 хворих з 1.09.05 по 1.02.06 на базі 3 –ї поліклініки м. Суми. В усіх випадках показаннями до оперативного лікування був розвиток місцевого інфекційного процесу. Виділено 2 групи хворих: 1-ша – 20 чоловік, яким проводилась радикальна операція (видалення частини нігтьової пластинки з пластикою нігтьового ложа); 2-га – 20 чоловік, яким була проведена паліативна операція (видалення 1/3 нігтьової пластинки і ведення рани, як гнійної).

Проведений аналіз показав, в першій групі патологічні зміни були виявлені у 5 (25 %) хворих, серед них: дискомфорт при ходьбі у 2 (10 %), гіперемія білянігтьового валика у 2 (10 %), рецидив у 1 (5 %). В 2-й групі патологічні зміни відмічались у 14 хворих (70 %): дискомфорт при ходьбі у 6 (30 %), деформація нігтьової пластинки у 5 (25 %), збільшення м'яких тканин пальця у 5 (25 %), гіперемія біля нігтьового валика у 4 (20 %), рецидиви - у 3 (15 %), біль при пальпації у 3 (15 %), розвиток гіпергрануляції - 3 (15 %).

Таким чином встановлено, що лікування врослого нігтя радикальним методом має перевагу, так як дає меншу кількість віддалених патологічних змін.