

## ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ ГЛАУКОМИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

*Дранко М.М., студ. 5-го курсу,  
Науковий керівник – асистент Чумак М.О.  
СумДУ, медичний інститут, кафедра ортопедії, травматології  
і невідкладних станів, курс офтальмології*

Глаукома займає перше місце серед причин інвалідності у зв'язку із незворотною втратою зору.

Під глаукомою розуміють групу захворювань, які мають одну і ту ж ознаку: високий внутрішньоочний тиск. В багатьох англomовних країнах термін „глаукома” об'єднує лише ті стани, коли спостерігається специфічне враження зорового нерва і відповідне йому зниження зорових функцій.

Метою нашого дослідження було вивчення ефективності консервативного та хірургічного лікування хворих на глаукому за матеріалами роботи відділення мікрохірургії ока Сумської міської клінічної лікарні № 5 за 2005 рік.

У всіх пацієнтів вивчалась гострота та поля зору, біомікроскопія, гоніоскопія, добова тонометрія, еластотометрія та тонографія по Несторову (за показаннями).

Було проаналізовано 120 карт хворих на глаукому. Вік пацієнтів складав від 40 до 75 років. З них чоловіки склали 62,5% (75 чол.), жінки - 37,5% (45 чол.). З усіх 120 хворих прооперовано 55 чол. (45,8%).

Вивчення цих показників проводилось на початку лікування і по його закінченню.

Також проводилось дослідження по стадіям захворювання. Хворі з I стадією захворювання становили 25% (30 чол.), з них прооперовано було 11 чол. (20%); хворі з II стадією становили 50% (60 чол.), з них прооперовано було 20 чол. (36,4%); хворі з III стадією захворювання становили 18,3% (22 чол.), прооперовано 15 чол. (27,3%) і з IV стадією захворювання - 6,7% (8 чол.), прооперовано 4 чол. (7,3% від усіх прооперованих).

Раннє виявлення глаукоми має вирішальне значення, так як дозволяє своєчасно розпочати відповідне лікування.