

**ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПЛАЗМАФЕРЕЗУ(ПФ) ПРИ ЛІКУВАННІ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ БА**

Любчак В.В., аспірант

*Науковий керівник – д-р мед.наук, проф. Каплін М.М.
Сумський державний університет,
кафедра нормальної та патологічної фізіології
з курсом медбіології та мікробіології*

На протязі більш ніж 10 років спостерігалися хворі на бронхіальну астму, котрі в загальне лікування додавали процедуру плазмаферезу. Встановлено, що включення в комплексну терапію БА (ПФ) супроводжується значним клінічним ефектом. При цьому спостерігали зменшення явищ бронхообструкції, зменшення кількості приступів ядухи, покращення відходження мокротиння і швидке купіювання гострих приступів.

Найбільша стійка, пролонгована ефективність за результатами наших спостережень починалась з 10 по 20 добу і досягала 85 % від загальної кількості хворих.

Ефективність лікування ранніх стадій астми завжди вище, а тривалість ремісії більше.

Завдяки використанню еферентних методів комплексного лікування завжди знижувалася доза використовуваних гормонів, а іноді це приводило до повної їх відміни та переводу пацієнтів на більш легкі препарати.

Ремісія в деяких випадках досягала значних термінів, наприклад, один з спостерігаємих хворих після проведення курсу плазмаферезу знаходився в стані ремісії 7 років, інший – 5 років. При тому, що мінімальний термін ремісії досягав 2 років.

Ці данні дозволять рекомендувати плазмаферез для лікування бронхіальної астми, а також з метою зменшення доз глюкокортикостероїдів особливо в тяжких випадках, астматичному статусі та при передастмі з метою запобігання переходу її в астму.