

ДО ПИТАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ МЕНІНГІТІВ У ДІТЕЙ

Марченко О.І., лікар-невролог; Хоменко О.І.,

лікар-анестезіолог

Науковий керівник – доц. Бинда Т.П.

Сумська міська дитяча клінічна лікарня,

Сумський державний університет, кафедра педіатрії №1

Гострі бактеріальні менінгіти є найбільш складним розділом нейроінфекційної патології дитячого віку. Не дивлячись на велику кількість наукових праць, присвячених різним аспектам цієї проблеми, вона і до теперішнього часу вирішена не повністю. Це в однаковій мірі стосується питань клінічної симптоматики і перебігу окремих форм менінгіту, картина яких в останні роки суттєво змінилася, а також раціонального застосування тих чи інших терапевтичних засобів.

Нами проведено аналіз захворювання дітей на бактеріальний менінгіт за 2002-2003 рр. Всього проліковано 66 хворих (2002 р. – 29 дітей, 2003 р. – 37 дітей) у віці від 3 міс до 13 років. Діти госпіталізувалися з різних районів Сумської області та м. Сум.

Пік захворювання прийшовся на серпень-вересень: у 2002 р. – 12 (41,4%) хворих , у 2003 р. – 14 (37,8%).

Найчастіше хворіли діти у віці від 3 до 10 років (76%, $p < 0,05$) Серед 26 дітей, які захворіли у серпні, переважали хлопчики (88%).

У лікуванні з антибактеріальною метою у серпні-вересні 2002 р. застосовували цефтріаксон у комбінації з ампіциліном. Середня тривалість лікування хворих на бактеріальні менінгіти становила 21,3 ліжка - день.

У 2003 р. у лікуванні використовували цефотаксим у комбінації з ампіциліном. Середня тривалість лікування склала 15,4 ліжка-дня.

Летальних випадків не було.

Таким чином, зменшення тривалості перебування хворого на ліжку на 5,9 ліжка-дня можна пояснити зміною в схемі лікування: заміною цефтріаксона на цефотаксим.