

## **ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ “НІМЕСУЛІД” У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ГРВІ**

*Куропятник Н.П., лікар-педіатр; Хрін Н. В., лікар-педіатр*

*Науковий керівник – доц. Січненко П.І.*

*Сумський державний університет, кафедра педіатрії №1*

*Сумська міська дитяча клінічна лікарня*

Проведено аналіз 29 історій хвороб дітей хворих на ГРВІ (переважно верхніх дихальних шляхів), в віці від 1 міс. до 3 років (з них 16 хлопчиків та 13 дівчаток). 9 пацієнтів отримували німесулід у вигляді монотерапії, 20 в комбінації з іншими препаратами. Німесулід призначався з розрахунку 1,5 мг/кг/добу, в 2 прийоми у вигляді сиропу. Тривалість прийому складала всередньому 7 днів. Оцінка ефективності проводилась по клінічним даним.

На фоні застосування препарату німесулід спостерігалось зниження температури тіла до субфебрильних цифр в перші години, а в подальшому нормалізація температури тіла в першу добу від початку прийому препарату німесулід. Більш швидка нормалізація температури відмічалась у дітей раннього віку. Катаральні явища (затруднене дихання через ніс, нежить, гіперемія зіву) у дітей з першої групи зникали на 4 – 5 день від початку лікування, що підтверджує протизапальну дію препарату німесулід.

В процесі лікування нами не відмічено ніяких побічних ефектів.

Таким чином, німесулід може застосовуватись для лікування діте хворих на ГРВІ, як самостійно, так і в комбінації з іншими препаратами.