

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ТРАНСВАГІНАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

*Сумцов Г.О., доцент; Орлова О.О., лікар-інтерн
СумДУ, кафедра акушерства та гінекології*

Післяопераційний період після трансвагінальних, особливо пластичних операцій часто ускладнюються гнійною інфекцією, що сповільнює загоєння рани та знижує ефективність втручання. Задовільні результати дає дворазова санація піхви 3% перекисом водню, який застосовується нами більше ніж 30 років. За останні 5 років в групі ризику септичних ускладнень, обробка перекисом водню доповнювалась введенням одного мілілітра суміші шипшинової олії та олії чайного дерева у співвідношенні 5 до 1. За названою методикою проведено післяопераційний період у 37 хворих. Отримано виражений дезодоруючий та ранозагоюючий ефект.

У вказаній групі хворих температура нормалізувалась на 1,5-2 доби раніше контрольної, не відмічено післяопераційних інфільтратів і нагноєнь, загоєння рани прискорилось на 2-3 добу, підвищилась функціональна активність хворих. Це дозволило скоротити тривалість антибактеріальної терапії та термін перебування в стаціонарі.