

**ОБ'ЄКТИВІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ  
ПРИ САЛЬМОНЕЛЬОЗІ**

*Фісун Я.В., лікар-інтерн*

*Науковий керівник - доцент Чемич М.Д.*

*СумДУ, кафедра інфекційних хвороб*

Вивчалась можливість використання інтегративних показників ендогенної інтоксикації: ЛП, ГП, ІЗЛК, Ілім, як критерію ступеня тяжкості сальмонельозу.

Під спостереженням було 42 хворих на сальмонельоз: чоловіків – 23, жінок – 19. Середній вік  $42\pm 3,5$  років. Гастроінтестинальна форма спостерігалась у 41(97,6%) хворого, генералізована у 1 – (2,4%); середній ступінь тяжкості за клінічними даними діагностовано у 25 (59,52%) хворих. Переважав гастроентероколітичний варіант (ГЕК) у 20 (80%) осіб, гастроентерит (ГЕ) - у 5 (20%). У 4 (16%) випадках захворювання спричиняла *S.typhimurium*, у 24 (84%) - *S.enteritidis*. У клінічній картині відзначалися блювання (48%), діарея -  $5\pm 1,2$  разів на добу, біль у мезогастральній та правій здухвинній ділянках, підвищення температури до  $38,2\pm 0,3$ С. Інтегративні показники ендогенної інтоксикації склали: ЛП– $3,3\pm 0,8$ ; ГП– $3,0\pm 0,9$ ; ІЗЛК– $2,7\pm 0,5$ ; Ілім– $0,4\pm 0,1$ . Перед виписуванням ЛП не нормалізувався, ІЗЛК знижався до верхньої межі норми.

Тяжкий перебіг спостерігали у 15 (35,71%) хворих, ГЕК – у 6 (40%), ГЕ – у 8 (53,33%), генералізована форма - у 1 (6,66%). У 1 (6,66%) пацієнта виділена *S.typhimurium*, у 14 (93,33%) - *S.enteritidis*. У клінічній картині відзначалися нудота (66,6%), блювання (66,6%), діарея  $8\pm 2$  рази на добу, розлитий біль у животі (40%), температура досягала  $38,6\pm 0,6$ °С. ЛП ( $7,08\pm 0,6$ ) та ГП ( $7,8\pm 0,2$ ) були значно вищими, ніж при середньому ступені тяжкості ( $P<0,05$ ). ІЗЛК ( $3,1\pm 0,3$ ) та Ілім ( $0,31\pm 0,1$ ) знаходились на тому ж рівні.

Таким чином, інтегративні показники ендогенної інтоксикації дають найбільш об'єктивну картину тяжкості перебігу сальмонельозу.