

## **ГРИБКОВА ІНФЕКЦІЯ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ОСІБ**

*Черенько М.С., студ. 5-го курсу*

*Науковий керівник – канд. мед. наук Анастасій І.А.*

*Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця,  
кафедра інфекційних хвороб*

До генералізованої грибової інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб відносять криптококову інфекцію. Найчастіше вражаються легені (криптококова пневмонія) та центральна нервова система (менінгоенцефаліт). Криптококовий менінгоенцефаліт характеризується гострим початком (фебрильна температура, менінгіальні симптоми) і відсутністю характерних змін у лікворі (помірний цитоз, помірне підвищення білку). Основним захворюванням, з яким слід диференціювати криптококову інфекцію (як пневмонію, так і менінгоенцефаліт) є туберкульоз. Враховуючи тяжкість ураження, основним діагностичним критерієм є проведення антифунгальної терапії *ex juvantibus*, яка повинна призвести до швидкого клінічного ефекту у разі криптококової інфекції. Виділення збудника захворювання з харкотиння або ліквору можливе не більше ніж у 30% хворих.

Таким чином: криптокок є основною причиною менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованих осіб.