

## **ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ “ДІАБЕТИЧНОЇ СТУПНІ”**

*Лукавенко І.М. студ. 4-го курсу  
Науковий керівник – доц. Бугайов В.І.  
Кафедра госпітальної та факультетської хірургії*

Приведені результати лікування 202 хворих із синдромом “діабетичної ступні” 3-4 стадії за Вагнером, які лікувались в МКЛІ № 5 м. Суми за період з 1998 по 2002 рр. Чоловіків було 97, жінок – 105 віком від 46 до 82 р. І тип цукрового діабету був у 48, II – у 154 хворих. Виразково-некротичні ураження пальців відмічені у 55 пацієнтів, флегмона ступні – у 98, флегмона ступні з розповсюдженням на гомілку – у 16, волога гангрена ступні – у 33, волога гангрена ступні і дистальної третини гомілки – у 9. Хворих з флегмоною ступні оперували в ургентному порядку. Проводилось широке розкриття запального вогнища, дронування гнійних заплівів з санацією розчином гіпохлориту натрію. Місцево використовували мазі на гідрофільній основі. Хворим з сухою відмежованою гангrenoю проводили консервативну терапію до появи чіткої лінії демаркації, потім виконували поетапну некректомію. Більш ніж у 60% хворих виконано в середньому від 2 до 3 некректомій. Після очищення ран накладали вторинні шви, цинк-желатинові пов'язки, виконували аутодермопластику. У 42 хворих з вологою гангrenoю по життєвим показанням виконана ампутація кінцівки на рівні верхньої третини бедра. Комплекс хірургічних і консервативних заходів у 142 (92,5%) із 153 хворих дозволив ліквідувати гнійно-некротичний процес. У 11 (7,5%) пацієнтів виконані ампутації.