

ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА

Брага Т.В., студ. 5-го курсу,

Брага І.В., студ. 2-го курсу

Науковий керівник – професор М.Г. Кононенко

СумДУ, кафедра госпітальної та факультетської хірургії

Травма сечового міхура є досить частою ургентною патологією – закриті пошкодження зустрічаються у 3-16 %.

Нами проведено ретроспективний аналіз 14 історій хвороб пацієнтів з травмою сечового міхура за період 1993 – 2003 рр. Чоловіків було 9, жінок – 5 віком від 19 до 77 років. Жителів міста було 12, села – 2.

Серед механізмів травми можна виділити: удар у живіт – 7, падіння – 3, без травми в анамнезі – 4. В стані алкогольного сп'яніння знаходилось 8 чоловік, один вживав невідомий яд.

При направленні та при госпіталізації пошкодження сечового міхура ні в кого не було розпізнане. Перед операцією травма сечового міхура була запідозрена у 3 хворих, у інших діагноз внутрішньочеревинного розриву сечового міхура встановлено інтраопераційно. Тому урологічне обстеження не проводилося.

Усім хворим виконане оперативне втручання під ендотрахеальним наркозом. У 12 хворих проведена середньо-серединна лапаротомія, у одного верхньо-серединна з розширенням донизу і лише у одного – нижньо-серединна. У всіх травмованих зашито дефект сечового міхура, у 12 пацієнтів накладена епіцистостома, а в 2 у сечовий міхур введено постійний катетер. Виписано 13 хворих, один пацієнт переведений в урологічне відділення СМКЛ №1.

Діагностика пошкодження сечового міхура, без підозри на нього, представляє певну трудність, проте лікування не представляє особливих проблем.