

## ВИПАДОК НЕЙРОШКІРЯНОГО МЕЛАНОЗУ

*Марченко О.І.  
Сумська МДКЛ*

Нейрошкіряний меланоз характеризується наявністю пігментних невусів великих розмірів на нижніх кінцівках, часто з волоссям або ізольовані невуси малих розмірів на різних частинах тіла; затримкою психофізичного розвитку, епілептичними нападами зумовленими інфільтрацією мозку меланобластами, дефектами нервової трубки, гідроцефалією, спинномозковою грижею.

В дитячому віці часто спостерігаються один або більше невусів.

Діти помирають частіше у перинатальному періоді.

Тривалість життя у хворих не перевищує 25 років. Тип спадковості домінантний. При цитогенетичному обстеженні нерідко виявляються пошкодження хромосом.

В відділенні неврології СМДКЛ в 2002 році знаходилась на лікуванні дитина Б., 5 міс. з ДС: нейрошкіряний меланоз, прогресуюча сполучена гідроцефалія в стадії декомпенсації, судомний синдром. Ураження шкіри пігментним невусом більше 60%. За час знаходження дитини у відділенні ріст голови склав 5 см (з 66 до 71 см).

Дитина померла від набряку мозку, зумовленого прогресуючою гідроцефалією.