

ВИКОРИСТАННЯ СПИННОМОЗКОВОЇ АНЕСТЕЗІЇ У ОСІБ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ З СКЛАДНИМИ ПАХОВИМИ ГРИЖАМИ

Брежнев В.П., Миронов П.Ю.

Луганський медичний університет, кафедра загальної хірургії

Хірургічне лікування хворих літнього і старечого віку завжди характеризується високим операційним ризиком. Це пов'язано із зниженням адаптаційних механізмів, наявністю різних супутніх захворювань, особливо серцево-легеневої системи. У зв'язку з цим все ширше використовуються різні види регіональної анестезії, які дозволяють зберегти функцію серцево-судинної і дихальної систем. Найбільш ефективне використання в цих випадках спинномозкової анестезії (СМА). Цей спосіб знеболення є методом вибору, значно знижує ризик хірургічної агресії, покращує перебіг післяопераційного періоду і знижує терміни стаціонарного лікування.

Хірургічна клініка загальної хірургії має в своєму розпорядженні досвід використання СМА у 76 хворих з складними формами пахових гриж у віці від 60 до 84 років. У всіх хворих відмічені різні захворювання серцево-судинної і дихальної систем. Всі хворі оперовані в плановому порядку. У передопераційному періоді проводилася корекція супутньої патології амбулаторно або стаціонарно. СМА проводилася в положенні хворого сидячи. Вводили 3 мл 0.5 % бупивакаїну. Це дозволяло викликати через 5-10 хвилин повну анестезію і хорошу релаксацію нижніх відділів тулуба і кінцівок. СМА рахували гнійно-запальні захворювання м'яких тканин в області пункції, алергічні реакції до місцевих антисептиків, нейро-вертебральні захворювання. Відмічено, що спірометричні, гемодинамічні і ЕКГ показники у всіх хворих залишалися стабільними.

Таким образом СМА дозволяє розширити свідчення до оперативного лікування хворих старшої вікової групи з складними формами пахових гриж і супутньою патологією.