

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

*Колінко Я. О., Колінко О. О., студ. 5-го курсу, 1 група
Наукові керівники: доц. Грижак І.Г., доц. Пришляк О.Я.
Державна медична академія, м. Івано-Франківськ
Кафедра інфекційних хвороб*

ВООЗ визначає в Україні реальним число уражених як 580 тисяч, що становить 1,2 % населення країни.

Мета дослідження: Встановити епідеміологічні особливості ВІЛ-інфекції в Івано-Франківській області і на основі отриманих даних проаналізувати ефективність протиепідемічних заходів, які проводяться у контингентах ризику.

В області станом на кінець 2004 року зареєстровано 491 ВІЛ-інфікованих особи. З них - 356 осіб проживають в м. Івано-Франківську, а решта 135 - в районах області. Середній вік уражених чоловіків 31, а жінок 28 років. Встановлено також питому вагу окремих шляхів зараження: парентеральне уведення наркотиків - 61,64%, гетеросексуальні зв'язки - 25,78%, перинатальна передача відбулася в 3,16 %. Спостерігалися й інші окремі випадки зараження: переливання крові, поріз чужою бритвою в тюрмі, гомосексуальні стосунки, невстановлений шлях зараження спостерігається у 8,02%. Кількість інфікованих чоловіків значно переважає над жінками: в 3,13 рази в обласному центрі (75,78 % проти 24,22%), а у 2,12 рази - в районах області (69,49 % проти 30,5%). Чоловікам більше притаманне вживання наркотиків – в обласному центрі в 3,87 рази більше ніж жінок, а в районах в 4,62 рази. Протилежна закономірність виявлена серед контингенту інфікованих статевим шляхом. Відносна кількість жінок, які заразилися у гетеросексуальних стосунках в 3,79 переважає чоловіків у місті та в 3,29 рази районах.

При аналізі ефективності протиепідемічних заходів в групах ризику на ВІЛ встановлено їхню недостатню результативність у зв'язку із низкою об'єктивних і суб'єктивних причин. Недостатні заходи з первинної профілактики ВІЛ-інфекції.