

**ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО, НАПІВВІДКРИТОГО
ТА ЗАКРИТОГО БЛОКУЮЧОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ
ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ**

Васюк С.В., студ. 6-го курсу

Науковий керівник – професор Рубленік І.М.

Буковинська державна медична академія

Кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії

Метою роботи було вивчення віддалених результатів блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу (БІМПО) при застосуванні нових і традиційних технологій заглибного остеосинтезу діафізарних переломів стегнової кістки.

З 1994 по 2003 рік у базових відділеннях кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинської державної медичної академії було виконано 268 операцій БІМПО стегнової кістки при переломах та їх наслідках (табл.1.)

Таблиця 1

Віддалені результати заглибного остеосинтезу діафізарних переломів стегнової кістки

Технологія остеосинтезу	Оцінка результатів						Всього
	добрі		Задовільні		Незадовільні		
	абс.	%	Аб с.	%	абс	%	
Відкритий БІМПО	104	89,66	7	6,03	5	4,31	116
Напів-відкритий БІМПО	55	91,67	3	5,00	2	3,33	60
Закритий БІМПО	8		-		-		8
Відкритий пластинами	69	82,06	11	13,10	4	4,76	84
Всього	236	88,06	21	7,84	11	4,11	268

Отримані результати свідчать про те, що за найбільш важливими показниками – кількості добрих та задовільних результатів – закритий БІМПО є найбільш ефективним методом заглибного остеосинтезу.