

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОГРЕСУВАННЯ ОСТЕОДЕФІЦИТУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ПРЕПАРАТОМ КАЛЬЦІЮ З ВІТАМІНОМ D

O.M. Масик (Тернопіль)

Метою даної роботи було дослідження ефективності препаратору "Сандокал-Д форте" (комбінація 500 мг кальцію карбонату та 440 МО вітаміну D₃) у профілактиці та лікування остеодефіциту у хворих на ревматоїдному артриті (РА), поширеність якого досягає 80 % усіх хворих. З цією метою протягом трьох років спостерігали за 42 пацієнтами з РА у віці 18-45 років. Основна група хворих (n=22) отримувала додатково до традиційного лікування "Сандокал-Д форте" по 2 порошку на добу; контрольна група (n=20) отримувала тільки традиційне лікування. Мінеральну щільність кісткової тканини поперекового відділу хребта та проксимального - стегна визначали за допомогою двофотонного рентгенівського денситометра DPXA ("Lunar Corp.", США). Трирічний моніторинг стану кісткової тканини у хворих на РА показав, що традиційне лікування не попереджує втрату кісткової тканини хворими із нормальнюю кістковою масою або остеопенією I-II ступеня у порівнянні із такою на початку спостереження, причому у 22,7 % із них розвинувся ОП. Включення у традиційну терапію препаратору "Сандокал-Д форте" сприяло фіксуванню кісткової маси на висхідному рівні у хворих із нормальнюю кістковою масою та більш похилому зменшенню її у хворих з остеопенією. У хворих з остеопенією III ступеня та ОП ефективності дослідженого препаратору не спостерігали.

Таким чином, використання "Сандокалу-Д форте" з метою профілактики та поглиблення остеодефіциту у хворих на РА може бути приводом для додовнення традиційних схем лікування таких хворих цим або аналогічними препаратами.

СИНДРОМ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЯК МАРКЕР ВАЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

C.I. Сміян, O.P. Барладин, Ю.М. Цяпа, М.Я. Ясніцька (Тернопіль)

В останні десятиріччя спостерігається стійка увага до вивчення етіопатогенетичних механізмів виникнення та прогресування бронхіальної астми (БА). Для цього використовують багаточисленні неспецифічні та специфічні лабораторно-інструментальні параметри, які з одного боку характеризують загальні аспекти порушення здоров'я, а з іншого особливості локальних змін.

Метою нашого дослідження було вивчення співвідношення показників ендогенної інтоксикації та ступеня порушення функції зовнішнього дихання у хворих на БА. Для реалізації мети було обстежено 85 хворих на БА віком від