

Фактори ризику розвитку бронхітів у дітей шкільного віку.

Кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Науковий керівник: д.м.н., професор Сміян О.А.

Сумський державний університет, медичний інститут
м. Суми, Україна

Бронхіти – одне з найбільш поширених захворювань органів дихання в дитячому віці. Рецидивуючі бронхіти призводять до порушення функціонування різних органів і систем, сприяють зниженню імунорезистентності організму і зриву компенсаторно-адаптаційних механізмів. Формуючись в дитинстві, бронхолегенева патологія визначає рівень захворюваності і інвалідності в старшому віці.

Метою нашого дослідження стало вивчення особливостей перебігу та вивчення факторів ризику розвитку бронхітів у дітей шкільного віку.

Під наглядом знаходилось 105 дітей (56 хлопчиків та 49 дівчаток) у віці 6-18 років з діагнозом гострий бронхіт. Було виявлено, що частіше патологія реєструється у пацієнтів до 9 років – 65% (62 хворих), 9-18 років – 35% (43 хворих). 74% (77 хворих) – с вперше зареєстрованим випадком гострого бронхіту, 26% (28 дітей) – рецидивуючий бронхіт.

Була проаналізована захворюваність на бронхіт в залежності від пори року. Зимом – 39 хворих, весною – 23, влітку – 11, восени – 32.

В анамнезі у дітей з бронхітами були виявлені такі фактори ризику: спадкова схильність до алергічних реакцій (48%), перенесені на першому році життя гострі респіраторні вірусні інфекції (66%), анемія (38 %). Найбільша захворюваність на гострий чи рецидивуючий бронхіт спостерігалась у дітей з перенесеною анте- і перинатальною патологією (у 68,2% випадках) та у тих, що знаходились на штучному вигодовуванні (64%). У майже всіх дітей (94 %) був хоча б один з батьків, що палить.

Таким чином, проблема бронхіту залишається одним з актуальних питань дитячої пульмонології і потребує подальшого вивчення і удосконалення тактики лікування цієї патології у дітей з урахуванням виявлених факторів ризику.