

МЕТОД ФОНОФОРЕЗА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

В.С. Бабич

Кафедра хирургических болезней СумГУ

144 человека, страдающих хроническим тонзиллитом, были подвергнуты местному лечению фонофорезом с лидазой или ронидазой по 0,5, фурагином по 0,5, витаминами "С" по 0,5, "В" по 0,2 и "РР" по 0,03, новокаином по 0,5 и гидрокортизоновой мазью 0,5% - 10,0.

Препараты вводились при помощи ультразвука в их комплексе на проекции небных миндалин. Внешняя аппликация проводилась с помощью аппарата УП - 1 (диаметр ультразвуковой головки 40мл) и ЛОР - 1А (диаметр ультразвуковой головки 20мл).

Оценка эффективности лечения проводилась по субъективным ощущениям больного, объективной картине глотки, клиническим и биохимическим показателям крови, по результатам аллергических и вегетативных проб. Особое внимание обращали на состояние регионарных лимфатических узлов. В зависимости от их состояния и наличия патологических изменений в небных миндалинах, количество сеансов колебалось в пределах 8-12 на курс по 5-6 на каждую миндалину ежедневно. К концу лечения у всех больных небные миндалины значительно уменьшались в размерах. У 81% пациентов лакуны миндалин стали широкими и зияющими, без патологического содержимого в них.

Регионарные лимфоузлы не пальпировались у 88% лечившихся и у 12% значительно уменьшились в размерах. Пульс и артериальное давление изменений не претерпевали.

Через 3 года проведенного лечения осмотрено 92 человека. Из них повторно болели ангиной только 6 человек и острыми респираторными заболеваниями 5. Таким образом, после лечения ангинами не болели 86 человек.