

кондитерських виробів з кремом і виробів м'ясної кулінарії, які не відповідають нормативним санітарно-бактеріологічним показникам. Своєчасне виявлення і санація носіїв шигел – потужний важіль зниження захворюваності на шигельоз.

Меленко Світлана Романівна  
**ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ  
В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології,  
Буковинський державний медичний університет,  
м. Чернівці, Україна

*Melenko Svitlana Romanivna*  
**EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF HIV/AIDS IN  
CHERNIVTSY REGION**

*Department of Infectious Diseases and Epidemiology,  
Bukovinian State Medical University, Chernivtsy, Ukraine  
E-mail: [ladymc84@gmail.com](mailto:ladymc84@gmail.com); Melenko S. R.*

**Актуальність.** Ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу на Буковині залишається стабільною, адже рівень поширеності ВІЛ-інфекції і розвиток епідемічного процесу протягом багатьох років залишається повільним, про що свідчать підсумкові рангові місця територіальної рейтингової оцінки останніх років, які посідала наша область. Проте залишається ще багато проблем.

**Мета роботи** – проаналізувати епідеміологічну ситуацію з ВІЛ-інфекції в Чернівецькій області станом на 01.01.2015 року та запропонувати заходи щодо її покращення.

**Матеріали і методи.** Для вирішення поставлених завдань проведено аналіз медичних карт амбулаторних хворих, які перебували на диспансерному обліку в Чернівецькому обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом з 2013

по 2015 рік, статистичні звіти з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції.

Використовувались аналітико-статистичні методи дослідження. Отримані дані обробляли з використанням програми “Microsoft Excel”, аналіз отриманих даних проводили за допомогою комп’ютерних пакетів “Biostat” на персональному комп’ютері із застосуванням методів варіаційної статистики.

**Результати дослідження.** З часу виявлення першого випадку ВІЛ-інфекції (1987 рік) до 01.01.15р. включно на Буковині офіційно зареєстровано 1 390 (по Україні – 264 657) випадків ВІЛ-інфекції: 366 (по Україні – 75 714) випадків захворювання на СНІД, 172 (по Україні – 35 287) випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом, 312 (по Україні – 44 415) дітей, які народилися ВІЛ-інфікованими жінками.

Показники нових випадків ВІЛ-інфекції залишаються приблизно на одному рівні протягом останніх трьох років, хоча темпи приросту збільшилися: +7,4 % (2014 рік) проти – 0,9 % (2013 рік).

Питома частка чоловіків серед ВІЛ-інфікованих продовжує переважати (60 %) за рахунок того, що переважно вони є основними споживачами ін’єкційних наркотиків. Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих зареєстрована у віковій групі 25-49 років – 550 (72,3 %), з них 255 склали жінки, 295 – чоловіки; 31 осіб – 18-24 років (4,0 %), з них 21 – жінки, 10 – чоловіки. Хоча зараз часто зустрічаються випадки інфікування ВІЛ серед осіб старшого віку після 50 років (7 осіб у 2014 році).

Термінальну стадію ВІЛ-інфекції встановлено в 2014 році 28 особам, при чому у 19 випадках ВІЛ-інфекцію встановлено вперше в цій стадії.

Найпоширенішим опортуністичним захворюванням при ВІЛ-інфекції та основною причиною розвитку СНІДу й смерті хворих з ВІЛ-інфекцією в області залишається туберкульоз. З 28 нових випадків СНІДу у 24 хворих вже був туберкульоз, а у 16 – вперше виявлений туберкульоз.

34 хворих на ВІЛ-інфекцію померло у 2014 році, з них від СНІДу – 16, 15 осіб – від інших хвороб, 3 – з інших причин.

Серед шляхів інфікування у 2014 році найпоширенішим залишається гетеросексуальний (60 %), 19 % – парентеральний, внаслідок уведення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом.

**Висновки.** Отже, в Чернівецькій області існує проблема пізньої діагностики ВІЛ-інфекції, яку у 21 % нових випадків виявляють у термінальній клінічній стадії; епідемії туберкульозу, яка тісно переплетена з ВІЛ-інфекцією. Тому потрібно збільшити рівень охоплення тестування на ВІЛ представників груп ризику, створити додаткові кабінети «Довіра» в поліклініках міста та районах, посилити співпрацю із фтизіатричною службою.

Меленко Світлана Романівна, Андрушак Маргарита  
Олександрівна, Кривецька Світлана Степанівна  
**ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ:  
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ**

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології,  
Буковинський державний медичний університет,  
м. Чернівці, Україна

*Melenko Svitlana Romanivna, Andrushchak Margaryta  
Oleksandrivna, Kryvetska Svitlana Stepanivna*  
**HERPETIC INFICTION IN HIV-INFECTED PATIENTS:  
CLINICAL FEATURES**

*Department of Infectious Diseases and Epidemiology,  
Bukovinian State Medical University, Chernivtsy, Ukraine  
E-mail: [ladymc84@gmail.com](mailto:ladymc84@gmail.com); Melenko S. R.*

**Актуальність.** У ВІЛ-інфікованих відбувається часта реактивація герпесвірусних інфекцій. У ході багатьох досліджень виявлено факт інфікування ВІЛ-позитивних