

Басенко Євген Володимирович, Крючков Юрій Юрійович,
Ничипорчук Олександра Федорівна,
Зюлковський Андрій Русланович
**ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ГРИПУ
СЕЗОНУ ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 2009 РОКУ ТА СІЧЕНЬ
– ЛЮТИЙ 2016 РОКУ У ДІТЕЙ**

Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. О. В. Виговська
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,
м. Київ, Україна

*Basenko Yevgen Volodymyrovych, Kryuchkov Yuriy Yuriyovych,
Nychporchuk Oleksandra Fedorivna,
Zyulkovskyj Andriy Ruslanovych*
**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CLINIC PICTURE OF
INFLUENZA OF THE SEASON NOVEMBER - DECEMBER
2009 AND JANUARY - FEBRUARY 2016 IN CHILDREN**

*Department of Children Infectious Diseases
Scientific supervisor: d. med. sc., prof. O. V. Vigovska
Bogomolets national medical university, Kyiv, Ukraine
E-mail: basenko.e@ukr.net; Basenko Y. V.*

Мета роботи. Дослідити особливості клінічної картини грипу сезону січень-лютий 2016 року серед дітей, що знаходились на стаціонарному лікуванні у Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні (КМДКІЛ) та порівняти їх з особливостями клінічної картини грипу сезону листопад-грудень 2009 року.

Матеріали та методи. За період січень – лютий 2016 – під спостереженням перебувало 47 дітей хворих на грип А Н1N1 pd Каліфорнія 2009. У період листопад-грудень 2009 року під спостереженням перебувало 135 хворих на грип, які проходили стаціонарне лікування у КМДКІЛ. Діагноз грипу встановлювався на підставі клініко-епідеміологічних даних та

лабораторних методів дослідження: імунохроматографічного аналізу (IXA) та PCR дослідження носогорлового змиву.

Результати дослідження. Переважаючими симптомами хворих на грип А/Н1N1 сезону січень-лютий 2016 року були: лихоманка - 100 %, гіперемія слизової рото глотки - 95,7 %, кашель - 76,7 %, загальна слабкість - 74,5 %, закладеність носу - 40,4 %, ринорея - 31,9 %, головний біль - 29,8 %. При аускультатії у більшості хворих (87,2 %) вислуховувалось везикулярне дихання, у 57,4 % - жорстке дихання. Клінічна симптоматика дітей, хворих на грип А/Н1N1 California 2009 сезону листопад – грудень 2009 року представлена такими симптомами: лихоманка, гіперемія слизової ротоглотки – 100 %, кашель – 73,1 %, загальна слабкість, кволість – у 69,2 %, головний біль – 44,2 %, закладеність носу – 40,4 %, біль у горлі – 38,4 %, міальгії – 25,0 %. При аускультатії у більшості хворих (90,4 %) вислуховувалось жорстке дихання, у 5,8 % - везикулярне дихання. У 90 % хворих стан було розцінено як середньотяжкий, у 10 % - важкий.

Висновки. Згідно опублікованих даних щодо грипу А/Н1N1 California 2009, клінічні характеристики захворюваності грипу сезону січень-лютий 2016 року суттєво не відрізняються від даних щодо грипу А/Н1N1 California 2009 сезону листопад-грудень 2009 року.