

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АМІКСИНОМ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В і С

*Столяренко К.А., Базін М.Є., студ. 5-го курсу
Науковий керівник – Захлебасва В. В.
СумДУ, медичний інститут, кафедра інфекційних хвороб*

Актуальність проблеми хронічних вірусних гепатитів В та С обумовлена високою кількістю інфікованих серед населення земної кулі (понад 500 млн.) та високим ступенем їх хронізації. Даний факт є підставою для пошуку ефективних засобів їх лікування та аналізу ефективності найбільш поширених препаратів, що використовуються в терапії ХГ.

Мета роботи – вивчити ефективність лікування аміксином хворих на ХГВ і ХГС, підтверджену полімеразною ланцюговою реакцією (ПЛР).

Проведено аналіз амбулаторних карт 83 хворих, які перебували під наглядом у Сумському обласному гепатологічному центрі. З них у 61 хворого був ХГВ, у 22 – ХГС. Для лікування хворих використаний імуномодулятор аміксин за загальноприйнятою схемою. Перед початком лікування досліджувалась кров хворих методом ПЛР на вірусне навантаження. Позитивні результати виявлені в усіх хворих у межах 10^3 (73,5 %) і 10^2 (26,5 %). Після проведеного лікування аміксином негативний результат ПЛР виявлений у 57 (69,2 %), у 26 (30,8 %) спостерігалось зменшення вірусного навантаження.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу аміксин має виражені імуномодулюючі властивості і його можна застосовувати для лікування ХВГ.