

ВІКОВІ ДЕГЕНЕРАЦІЇ СІТКІВКИ
Столяренко К.А., студ. 5-го курсу
Науковий керівник – асистент Чумак М.О.
СумДУ, медичний інститут,

кафедра ортопедії, травматології та невідкладних станів

До найбільш часто зустрічаємої патології серед вікових дегенерацій сітківки слід віднести хоріоретинальні дистрофії, обумовлені віковими змінами в організмі. Багатьма дослідниками хоріоретинальні дистрофії розглядаються як місцева реакція ока на загальний інволюційний процес. В розвитку цих змін надають великого значення порушення мікроциркуляції в судинах сітківки та хороїдеї, первинним дистрофічним змінам в скловидній мембрані Бруха, змінам пігментного епітелію, порушенням обмінних процесів, патології ензимів тощо.

Метою нашого дослідження було вивчення ефективності консервативної терапії, за певною схемою лікування хворих з хоріональною дистрофією, за матеріалами роботи відділення мікрохірургії ока Сумської міської лікарні №5 за 2006 рік.

Було проаналізовано 110 карт хворих на хоріональну дистрофію сітківки. Вік пацієнтів складав від 55 до 75 років. З них чоловіки склали – 53,6% (59 чоловік), жінки – 46,5% (51 чоловік).

Також проводилось дослідження по стадіям захворювання. Хворі з початковою (неексудативною) стадією захворювання становили 60% (66 чол.), хворі з ексудативно-геморагічною стадією становили 21,5% (24 чол.), хворі з стадією рубцювання – 18,5% (20 чол.).

Критерієм терапевтичної ефективності у досліджуваних є динаміка гостроти зору, поля зору, терміну перебування в лікарні, стану здорових функцій після виписки зі стаціонару.