

## **ВАРІАНТИ КІНЦЕВИХ ГІЛОК ПЛЕЧОВОЇ АРТЕРІЇ**

*Базін М.Є., студ. 3-го курсу*

*Науковий керівник - доц. Устянський О.О.*

*СумДУ, кафедра нормальної анатомії*

Нами раніш (Базін М., 2003) повідомлялось про варіант кінцевих гілок плечової артерії, при якому променева артерія відходила від плечової у верхній третині плеча. Вивчаючи методи препарування індивідуальні особливості артерій верхньої кінцівки, ми виявили варіант, при якому ліктьова артерія відходила від плечової в середній третині плеча. Вона мала значно менший діаметр, ніж при звичайному варіанті відходження, та майже не віддавала гілок на всьому протязі до проникнення на кисть. Відразу є після відходження від стовбуру плечової артерії, ліктьова артерія в супроводі двох вен-супутниць розташовувалась на передньо-присередній поверхні двоголового м'язу плеча, прямуючи до ліктьової ямки. В ліктьовій ямці вона заходила під апоневроз двоголового м'язу плеча. Вийшовши на передпліччя, вона пробивала черевце довгого долонного м'язу та поруч з сухожилком цього м'язу прямувала до утримувача м'язів-згиначів. Через ліктьовий канал зап'ястка поруч з одноіменним нервом вона виходила на долоню та формувала невелику за розмірами і діаметром поверхневу долонну дугу. Вивчені основні морфометричні параметри цієї артерії. Виявлений нами варіант необхідно враховувати при хірургічних втручаннях в області плеча та передпліччя.