

ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРУ АПФ-АККУПРО В ЛІКУВАННІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ

*Ветох І.В., Бойко Л.М., Тисячка Т.М., студ. 3-го курсу
Науковий керівник – асист. Псарьова В.Г.
СумДУ, медичний інститут, кафедра внутрішньої медицини*

Мета роботи: Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) з використанням інгібітора АПФ-аккупро.

Завдання дослідження: Проаналізувати вплив інгібітора АПФ-аккупро на клінічний стан хворих ГХ II стадії.

Методи дослідження: Використані загальноклінічні методи дослідження, ЕКГ та ЕХО-кардіоскопія. Стадія ГХ визначалася за класифікацією, прийнятою VI конгресом кардіологів в 2000 році.

Матеріали та методи: Обстежено 32 хворих (11 чоловіків та 21 жінка) віком від 42 до 63 років (52,5). Критерієм відбору була наявність гіпертонічної хвороби II стадії, підтвердженої клініко-інструментальними методами дослідження. Серед факторів ризику: паління, на момент обстеження 6 чол. (18,7%); цукровий діабет у 2 чол. (6,2%); у одного хворого (3,1%) екстрасистолічна форма шлуночкової аритмії. Доза аккупро 40 мл/добу. Повторне обстеження проводилося через 2 тижні після первинного. Група порівняння складала 23 чоловіки, в лікуванні яких використовувалися бета блокатори та антагоністи кальцію.

Висновки: Досягнення цільових цифр АТ спостерігалось у 31 чоловіка (96,8%) на кінець першого тижня від початку лікування. В кінці терміну спостереження клінічний стан хворих значно покращився (відсутні скарги на головний біль, біль в області серця, запаморочення, серцебиття, набряки, задишку), зберігалась стабільність досягнутих цільових цифр АТ.