

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗУ

Каплун І.Г., студ. 3-го курсу

Науковий керівник - асист. Мадяр В.В.

СумДУ, медичний інститут, кафедра загальної хірургії

Панкреонекроз є надважким ускладненням ряду гострих та хронічних захворювань органів черевної порожнини. Діагностика цього складного захворювання, навіть за допомогою сучасних променевиx методів обстеження, залишається важкою та нерідко запізнілою.

у хірургічному відділенні протягом 2004-2005 рр з приводу гострого панкреатиту та його ускладнень лікувалось 9 хворих. Із них жінки склали тільки 22% (2), а більшість 77,8% (7) були чоловіки. Важливим є те, що 55,6% (5) хворих були віком до 35 років, 35-55 – 1 (11,1%), більше 55 років – 3 (33,3%) хворих. Абсолютна більшість пацієнтів 8 (88,9%) панкреатитом хворіли в зимово-весняний період, що зумовлене ослабленням імунної системи, авітамінозом, переохолодженням та великою кількістю святкових днів у зазначений період.

Усім хворим було виконано оперативне втручання по невідкладним показанням із попередньою 4-6 годинною інфузійною, дезінтоксикаційною та корегуючою терапією. Передопераційне лікування проводиться під контролем анестезіолога. Операція включала верхньо-серединну лапаротомію, ревізію черевної порожнини, холецистектомію, дренування черевної порожнини, порожнини малого сальника, заочеревинного простору після попереднього видалення секвестрів, гематом, некротизованих ділянок підшлункової залози. Дренування парапанкреатичної клітковини проводили через 4-6 2-х просвітні трубки, які виводились через поперекову зону зліва і справа від хребта. 2-4 рази на добу, в залежності від активності процесу, проводили фракційне промивання розчинами антисептиків з антибіотиками широкого спектру.

Таким чином, активне оперативне та консервативне лікування дозволило вилікувати усіх хворих.