

РЕГІОНАРНА АНЕСТЕЗІЯ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРИЧАННЯХ НА ВЕРХНІХ КІНЦІВКАХ

Матлай О.І., студ. 5-го курсу

Науковий керівник - доц. Шишук В.Д.

*СумДУ, медичний інститут, кафедра ортопедії, травматології
та невідкладних станів, курс ортопедії та травматології*

1. У залежності від рівня ушкодження анестезія на наступних рівнях:
Плечове сплетення надлопатковий нерв в області променево - зап'ястного суглоба анестезія пальців.
2. Анестезія плечового сплетення підрозділяється на підключичну і на пахвинну анестезію. Пахвинний метод анестезії показаний переважно при вираженій легеневої недостатності, при утрудненому контакті з потерпілим на догоспитальному етапі. Підключичний метод – оперативне втручання у верхньої третини плеча, в області плечового суглоба і плечового пояса, якщо не можна відвести кінцівку в плечовому суглобі.
3. Анестезія надлопаткового нерва використовується при діагностиці і лікуванні хворих у плечовому суглобі і прилягаючих ділянках.
4. При ушкодженні серединного ліктьового і променевого нервів використовують анестезію в області променево - зап'ястного суглобу.
5. При простих операціях на пальцях використовують анестезію волярних і дорзальних нервів.

Таким чином, на вибір методу анестезії впливає: характер і рівень ушкодження, загальний стан потерпілого, передбачуваний оперативне втручання.