

ПРИЧИНИ СМЕРТІ ХВОРИХ НА МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ

*Ярова О.Д., Северіна О.С., студ. 4-го курсу
Науковий керівник – аспірант Коленко О.І.
СумДУ, курс нервових хвороб*

Інсульт належить до невідкладних медичних станів. Особливістю його клінічного перебігу є досить швидко виникаючі розлади свідомості та порушення функцій життєво важливих органів і систем, складні патобіохімічні процеси. Одним з важливих чинників, які визначають перебіг і наслідки захворювання є проміжок часу від початку інсульту до надання медичної допомоги („терапевтичне вікно” - перші 1-6 годин після розвитку інсульту).

Метою нашої роботи був аналіз причин смерті хворих з мозковим інсультом в залежності від строків надання невідкладної допомоги, виду і характеру розвитку хвороби, віку хворих, стану свідомості, наявності та термінів виникнення супутньої патології, ускладнень процесу. Проаналізовано 40 історій хвороби померлих від інсульту віком 45-75 років. Значна доля померлих була від крововиливу. Співвідношення геморагій і ішемій 1:3. Стан хворих був важкий чи край важкий. Важливою прогностичною ознакою фатальних наслідків був ступінь розладу свідомості, визначений у 50% хворих. Аналіз ситуації в різних вікових групах демонструє збільшення смертності з віком хворих, досягаючи найбільших значень після 60 років, що зумовлено обмеженням компенсаторних можливостей організму. Період 6-10 діб характеризується розвитком соматичних ускладнень, загострення хронічних захворювань: ішемічної хвороби серця, захворювання бронхів та легень з наростанням ступеню дихальної недостатності, захворювання нирок, цукрового діабету та інш. Основна причина смерті хворих - набряк головного мозку з розвитком дислокаційного синдрому з впливом на медіальні і стовбурово-каудальні структури, порушення вітальних функцій.